

SCHEDA N° 0618 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Schizophyllum	SPECIE commune	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 17.08.2020	LUOGO DIRACC. Val Canali	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☒ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso (prevalente) e Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI Faggio

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti diversi esemplari su tronchi accatastati ai bordi di una strada..



MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, 4.2-5.2 x 2.6-2.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C., ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI

BASIDIE BASIDIOLI

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello reniforme, di 2-3 cm di diametro, con superficie villosa, vellutata, grigio biancastra, con qualche macchia di verde: orlo involuto ed ondulato.

Lamelle disposte i fasci, spaziate, con filo fessurato, di colore crema carnicino fino a rossastro.

Gambo praticamente assente (quando se ne intravede un accenno rudimentale, è costituito dalla confluenza delle lamelle per un breve tratto).

Carne tenace e fibrosa, biancastra; senza odori e sapori particolari.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, di $4.2-(4.69)-5.2 \times 2.6-(2.69)-2.8 \mu$, con Q: 1.6-(1.74)-1.86.