

SCHEDA N° 0603 AMS_PD
ORDINE Sclerodermatales

GENERE Scleroderma	SPECIE polyrhizum	AUTORE (J.F. Gmel.) Pers.	
DATA DI RACCOLTA 15.09.2016	LUOGO DI RACC. Viola	COMUNE Ceva	PROV. CN
ALTITUDINE S.L.M. 500 m	I.G.M. 228-IV	RACCOGLITORE Marco Sandri	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Quercia (prevalente) e Castagno		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari, per lo più isolati.

MICROSCOPIA: Spore subsferiche, bassamente aculeate, parzialmente connesse, 7.3-8.5 x 6.7-8.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHID'ITALIA (3)

DETERMINATORE Marco Sandri

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

BASIDIOCARPI

SPORE



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Basidiocarpo subgloboso, tuberiforme, schiacciato, con superficie irregolare, squamoso, di colore dal giallo scuro al bruno; con la maturazione presenta delle lacerazioni per permettere l'uscita delle spore.

Peridio molto grosso, bianco al taglio; gleba bruna, virante all'azzurro, nera a maturazione.

Microscopia. Spore subsferiche, bassamente aculeate, parzialmente connesse a formare un reticolo irregolare, di $7.3-(8.0)-8.5 \times 6.7-(7.08)-8.0 \mu$, con Q: 1.03-(1.13)-1.19.