



SCHEDA N° 0773 AMS_PD

ORDINE Boletales

	SPECIE grevillei	AUTORE (Klotzsch) Singer 1945
DATA DI RACCOLTA 13.08.2023	LUOGO DI RACC. Monte Bedolè	COMUNE Primiero S.Martino PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli
HABITAT:		
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	■ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete Rosso con Lario	ાં	□ RADO □ FITTO
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBR	OSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO		
Note: Rinvenuti alcuni esemplari in vari stadi.		
MICROSCOPIA: Spore ellissoidali,	8.0 x 3.5 μm.	
BIBLIOGRAFIA: PAPETTI C, CONSIG	GLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFI	CO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)
DETERMINATORE Franco Mangar	nelli RILIEVI EFFETT	UATI SU REPERTI
CARPOFORO	CARPOFORO	CARPOFORI





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 5-6 cm di diametro, inizialmente emisferico poi quasi spianato, orlo sottile; cuticola liscia, abbastanza vischiosa, asportabile, di colore giallo, giallo fulvo.

Tuboli lunghi quasi 1 cm, adnati o leggermente decorrenti, gialli; pori molto piccoli, rotondi, dello stesso colore dei tuboli.

Gambo più lungo del diametro del cappello, quasi cilindrico, leggermente allargato verso la base; si intravvedono resti di velo parziale; il colore è giallo chiaro, poi brunastro chiaro.

Carne inizialmente soda, poi molle ed acquosa nel cappello e fibrosa nel gambo; colore giallognolo con tonalità rosato-violette al taglio; odore gradevole, sapore dolce-acidulo.

Microscopia. Spore ellissoidali di 8.0 x 3.5 µm; sporata bruno oliva.