

SCHEDA N° 0563 AMS_PD
ORDINE Tremellales

GENERE Tremiscus	SPECIE helvelloides	AUTORE (DC.) Donk	
DATA DI RACCOLTA 17.09.2021	LUOGO DI RACC. Passo Cereda	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1400 m	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso e Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Diverse piante di Felce.

NOTE: Rinvenuti su accumulo di detriti trasportati da forte pioggia.

MICROSCOPIA: Spore cilindrico-ellissoidali, con evidente apicolo, 8.0-11.0 x 5.1-6.0 µm.


BIBLIOGRAFIA: PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)


DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORO

CARPOFORI

CARPOFORI

BASIDIO

SPORA

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Basidiocarpo petaloide, spatoliforme, fissato nel substrato dalla parte più sottile della spatola; superficie interna liscia, di colore rosso-ciliegia o rosso-salmone, ricoperta a volte di una leggera pruinosità biancastra; superficie esterna più pallida o concolore, ondulato-venosa; orlo lobato, ondulato in basso.

Imenoforo non distinto (collocato nella parte alta ed esterna).

Carne elastica, gelatinosa, di colore rossastro; senza odori e sapori particolari.

Microscopia. Spore cilindrico-ellissoidali, con evidente apicolo, di 8.0-11.0 x 5.1-6.0 μm ; basidi con sterigmi molto lunghi e di forma globosa.