



SCHEDA N° 0594.A AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Tricholoma	SPECIE orirubens	AUTORE Quél. 1872]
DATA DI RACCOLTA 15.10.2019	LUOGO DI RACC. Campolongo	COMUNE Rotzo Prov. VI]
ALTITUDINE S.L.M. 1550 m	I.G.M. 082-II	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	
HABITAT:			
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA	
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A]
ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI: Abete rosso e A. bianc	o con qualche Faggio	⊠ RADO ☐ FITTO	
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
☐ SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI]
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA 🖂 G	OMBROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	ACQUITRINOSO MOLTO U	UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO]
Note: Rinvenuto un gruppo di 5	-6 esemplari sotto Faggi.]
MICROSCOPIA: Spore largamente	ellissoidali, 5.1-6.0 x 4.0-4.6 μ.]
BIBLIOGRAFIA: GALLI R., I TRICOI	LOMI – DALLA NATURA		
DETERMINATORE Mauro Baldan			•
L	RILIEVI EF	FFETTUATI SU REPERTI SFRESCHI SECCHI	
CARPOFORI	SPORE	BASIDI	
TERMINALI			





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello da globoso ad appianato, di circa 3-4 cm di diametro negli esemplari maggiori, dotato di umbone ottuso; cuticola asciutta, di colore grigio-brunastro, più scura al centro, ricoperta da squamule nerastre; bordo inizialmente involuto, sottile, talora fessurato.

Lamelle smarginate, non molto fitte, dotate di lamellule; grigiastre, con il tempo arrossanti nella parte prossima a bordo e sul filo.

Gambo carnoso, fibroso, con piccolo bulbo basale; di colore biancastro, sfumato di bruno nella regione inferiore, con toni bluastri alla base.

Carne biancastra, rossastra all'aria, con toni blu-verdi alla base negli esemplari adulti; odore fruttato, sapore dolciastro.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, guttulate, apicolate, di 5.1-(5.57)- 6.0×4.0 -(4.45)- 4.6μ , con Q: 1.25-(1.32)-1.46; basidi fortemente allungati, tetrasporici; elementi terminali irregolarmente cilindriformi; non rilevati GaF in alcun tessuto.