

SCHEDA N° 0704 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Tricholoma	SPECIE saponaceum	AUTORE (Fr.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 16.10.2022	LUOGO DIRACC. Cesuna	COMUNE Roana	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 1050 m	I.G.M. 082-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Conifere (prevalenti) miste a Faggi e Noccioli		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA



UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE :
MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, ialine, 4,5-5,0 x 3,3-3,9 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F., ATL. FUNGI OF SWITZERLAND (3)

DETERMINATORE Enzo Cantarello

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

IFE EPICUTE

GAF

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo emisferico, con largo umbone ottuso, di circa 5-6 cm di diametro; cuticola asciutta, radialmente fibrillosa; di colore grigio-bruno olivastro, più chiaro al margine.

Lamelle adnato-smarginate, non molto fitte, alternate a lamellule, di colore biancastro.

Stipite cilindrico, fusiforme verso la base, con lunghe striature longitudinali; di colore bianco-grigiastro, brunastro alla base.

Carne dura e fibrosa; odore (molto tenue negli esemplari rinvenuti) di sapone di marsiglia.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, lisce, ialine, di $4.5-(4.83)-5.0 \times 3.3-(3.54)-3.9 \mu$, con Q: $1.26-(1.37)-1.48$; epicute irregolare, a ife con granulazione brunastra, talora dotate di GaF.