

SCHEDA N° 0759 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Tricholoma	SPECIE sciodes	AUTORE (Pers.) C. Martín 1919	
DATA DI RACCOLTA 08.10.2023	LUOGO DI RACC. Lavarone	COMUNE Lavarone	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 081-I	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso (prevalente), Faggio, Nocciolo		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuto un gruppo di 4 esemplari in prossimità di Faggi.


MICROSCOPIA: Spore largamente ellissoidali, 6.6-7.2 x 4.8-5.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : GALLI R., I TRICOLOMI – DALLA NATURA

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

TERMINALE E BASIDIOLI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano-convesso, con umbone ottuso, di circa 4-5 cm di diametro negli esemplari più grandi; cuticola asciutta, fibrillosa, di colore grigio metallico; orlo a lungo involuto, eccedente.

Imenoforo a lamelle smarginate, alternate a lamellule; di colore bianco-grigiastro; filo un po' crenulato, biancastro ma inscurentesi con l'età.

Stipite cilindrico, con apice forforaceo, da bianco a grigiastro nella regione inferiore.

Carne bianco-grigiastra; odore debolmente terroso, sapore da amarognolo ad acre.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, 6.6-(6.95)-7.2 x 4.8-(5.34)-5.7 μ , con Q: 1.23-(1.3)-1.37; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici.