

SCHEDA N° 0632 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE Xerocomus	SPECIE moravicus	AUTORE (Vaček) Herink	
DATA DI RACCOLTA 09.10.2020	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S. Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1.5 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: **Leccio (prevalente), Pioppo e Pino a due aghi.**

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO |

ESPOSIZIONE:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ASSOLATA | <input checked="" type="checkbox"/> OMBROSA | <input type="checkbox"/> MEDIA |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|

UMIDITA' DEL TERRENO

- | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ACQUITRINOSO | <input type="checkbox"/> MOLTO UMIDO | <input checked="" type="checkbox"/> UMIDO | <input type="checkbox"/> ASCIUTTO | <input type="checkbox"/> SECCO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuti 6 esemplari in un prato appena fuori la macchia.**

MICROSCOPIA: **Spore lungamente ellissoidali, con 1-3 guttule, 11.6-13.5 x 4.9-6.3 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **GALLI R. - I BOLETI - EDI NATURA**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI



EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico a piano-convesso, in alcuni casi lobato, di circa 5 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola vellutata, asciutta, desquamata all'orlo (non sempre), di colore bruno.

Imenio con tubuli sottili, per lo più adnati (talora subdecorrenti); pori angololari, inizialmente piuttosto piccoli; nessun viraggio alla pressione.

Stipite cilindrico, talora ricurvo, un po' affusolato alla base; striato longitudinalmente.

Carne fibrosa nel gambo; biancastra nella regione sottocuticolare, brunastra nel gambo; nessun viraggio; odore leggermente fruttato.

Microscopia. Spore lungamente ellissoidali, con 1-3 guttule, lisce, talora con depressione preclare, di $11.6-(12.55)-13.5 \times 4.9-(5.54)-6.3 \mu$, con Q: 2.07-(2.27)-2.53; basidi clavati, (bi-) tetrasporici, $32.0-33.5 \times 11.4-11.7 \mu$; ife dell'epicute irregolari, talora catenulate, pigmentate.