

SCHEDA N° 0761 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE Xerocomus	SPECIE pruinatus	AUTORE (Fr.) Quél.	
DATA DI RACCOLTA 12.10.2023	LUOGO DI RACC. Cansiglio	COMUNE Tambre	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1050 m	I.G.M. 064-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: **Aghifoglia (Abete rosso, A. bianco) e Faggio**

RADO FITTO

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuti tre esemplari in uno spiazzo sotto Abete rosso.**

MICROSCOPIA: **Spore ellittico-fusiformi, con depressione soprailare, guttulate, 12.1-14.6 x 4.9-5.9 µ.**


BIBLIOGRAFIA : **GALLI R. - I BOLETI - EDINATURA**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




CARPOFORI



SPORE



BASIDI



CISTIDI



TERMINALI EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico a convesso, di circa 6 cm di diametro nell'esemplare maggiore; cuticola vellutata, asciutta, di colore rosso-brunastro, screpolata soltanto nella regione periferica; orlo sottile, talora un po' ondulato.

Imenio con tubuli relativamente corti, adnato-depressi al gambo, di colore giallo limone pallido, leggermente azzurri per esposizione all'aria; pori concolori, leggermente blu alla pressione.

Stipite cilindrico, asciutto, pruinoso-fibrilloso, di colore giallo percorso da fibrille longitudinali rossastre, giallo all'apice, base biancastra.

Carne soda (presto molle nel cappello), fibrosa nel gambo; di colore giallino, con lento viraggio all'azzurro; odore e sapore gradevoli.

Microscopia. Spore ellittico-fusiformi, con depressione soprailare, guttulate, di 12.1-(13.37)-14.6 x 4.9-(5.42)-5.9 μ , con Q: 2.14-(2.47)-2.8; basidi clavati, tetrasporici; cistidi fusiformi; epicute di catene di ife con elementi piuttosto tozzi, a pigmento incrostante.