

SCHEDA N° 0598 AMS\_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Xerula</i>	SPECIE <i>radicata</i>	AUTORE (Relhan) Dörfelt	
DATA DI RACCOLTA 17.09.2020	LUOGO DI RACC. Monte di Malo	COMUNE Faedo	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 500 m	I.G.M. 082-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI: Latifoglie miste (prevalenti Quercia e Castagno)</b>		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenute su detriti legnosi (radici ?) interrati.

MICROSCOPIA: Spore largamente ellissoidali, lisce, ialine, guttulate, 12.1-16.2 x 8.7-11.5 µ.


BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (3) - MYCOLOGIA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI




CARPOFORI




SPORE



BASIDI



CISTIDI



EPICUTE

## DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** da campanulato a piano, con basso umbone), di circa 5 cm di diametro nell'esemplare più grande, con margine sottile; cuticola liscia e opaca, negli esemplari più anziani con rugosità radiale, di colore ocraceo/bruno chiaro.

**Imenoforo** con lamelle adnate subdecorrenti mediante fitte, alternate a numerose lamellule; di colore biancastro, con filo intero concolore.

**Stipite** cilindrico, slanciato, fibroso, con regione basale appena ingrossata; prosegue nel substrato di crescita a mo' di fittone; concolore al cappello.

**Carne** biancastra, priva di odore o sapore spiccati.

**Microscopia.** Spore largamente ellissoidali, lisce, ialine, guttulate, di 12.1-(14.46)-16.2 x 8.7-(10.02)-11.5  $\mu$ , con Q: 1.31-(1.44)-1.65; basidi clavati, tetrasporici, 65 x 14  $\mu$ ; cistidi fusiformi-ventricosi; epicute costituita da cellule da clavate a vescicolose.