

SCHEDA N° 0744 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Panaeolus</i>	SPECIE <i>campanulatus</i>	AUTORE (L.) Quéf.	
DATA DI RACCOLTA 09.07.2010	LUOGO DI RACC. Transacqua	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 750 m	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :




NOTE : Rinvenuti su terriccio molto organico vicino all'erba.

MICROSCOPIA: Spore quasi amigdaliformi-lenticolari, 12.1-14.2 x 7.6-9.5 µm.

BIBLIOGRAFIA : COURTECUISSÉ R., DUHEM B. – GUIDE DES CHAMPIGNONS DE FRANCE ET D'EUROPE
 CONSIGLIO G., PAPETTI C. - ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 2-3 cm di diametro, campanulato, grigio-bruno-castano, più scuro al centro, igrofano; margine eccedente e un po' frangiato-dentellato.

Lamelle leggermente ventricose-adnate, con il bordo più chiaro (per le spore che maturano in tempi diversi; vedi microscopia).

Gambo slanciato, quasi cilindrico, leggermente attenuato in alto; quasi concolore (un po' più sbiadito) al cappello.

Carne molto esigua e con colore; non osservati odori e sapori.

Microscopia. Spore quasi amigdaliformi-lenticolari, di 12.1-14.2 x 7.6-9.5 μm ; polvere sporale nerastra.