



SCHEDA N° 0828 AMS_PD

ORDINE Amanitales

GENERE Amanita	SPECIE muscaria AUTORE (L.) Lam. 1783		
DATA DI RACCOLTA 19.10.2024	LUOGO DI RACC. Colli Euganei	COMUNE Rovolon	Prov. PD
ALTITUDINE S.L.M. 300 m	I.G.M. 147-IV	RACCOGLITORE Franco Manga	anelli
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA	
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI: Quercia e Castagno		☐ RADO	FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
☐ SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI	
ESPOSIZIONE:	⊠ ASSOLATA □ OMBI	ROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Dive	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMID	O 🗵 UMIDO 🗌 ASCIUTTO	☐ SECCO
Note: Rinvenuti vari esemplari in diverso stadio di sviluppo.			
MICROSCOPIA: Spore quasi ovoidali, 9.0-10.0 x 6.0-7.0 μm.			
BIBLIOGRAFIA PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B.			
DETERMINATORE Franco Manganelli			
RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI			
CARPOFORO	CARPOFORO	CARE	POFORI
SPORE	SPORE		





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 8-10 cm di diametro, convesso-spianato, con cuticola liscia, quasi sempre ricoperta da verruche bianche (residui del velo generale); leggermente striato verso l'orlo e di colore rosso con qualche tonalità arancione.

Lamelle fitte, bianche o con un leggero riflesso giallastro.

Gambo cilindrico, abbastanza slanciato, di colore biancastro, provvisto di anello membranoso posizionato in alto e con resti di velo generale sul bordo; volva sottile, dissociata in verruche concentriche biancastre.

Carne soda nel cappello, fibrosa nel gambo; bianca e sfumata di rossiccio; di odore quasi nullo.

Microscopia. Spore quasi ovoidali, 9.0-10.0 x 6.0-7.0 μm, non amiloidi; bianche in massa.