



SCHEDA N° 0811 AMS_PD

ORDINE Amanitales

GENERE Amanita	SPECIE spadicea	AUTORE Pers. 1797
DATA DI RACCOLTA 30.08.2024	LUOGO DI RACC. Passo Cereda	COMUNE Primiero S. Martino Prov. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1400 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli
HABITAT:		
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	ARENILE
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Faggio con delle conife	ere	□ RADO □ FITTO
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	□ vivo □ morto i	DI IO
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBRO	OSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO		
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Qualche cespugio di latifoglie.		
NOTE: Rinvenuto un singolo esemplare.		
MICROSCOPIA: Spore globose, di 10.0-11.0 μm di diametro.		
BIBLIOGRAFIA: CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL.FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3) – A.M.B.		
DETERMINATORE Franco Manganelli RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI □ SECCHI		
CARPOFORO LAMELLE SPORE		
BASIDI		





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 4-5 cm di diametro, convesso-spianato, con umbone ottuso; il bordo si presenta con fini striature, il colore è brunastro con sfumature rossicce, con il disco più scuro.

Lamelle libere, fitte, con lamellule, di colore bianco.

Gambo slanciato, non proprio esile, cilindrico, attenuato in alto e base bulbosa; colore bianco con striature concolori al cappello; **volva** ampia e inguainante, di colore biancastro.

Carne tenera, biancastra ma brunastra vicino alla cuticola, senza odore significativo e sapore gradevole.

Microscopia. Spore globose, di 10.0-11.0 μm di diametro; basidi clavati.