

SCHEDA N° 0812 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Asterophora	SPECIE lycoperdoides	AUTORE (Bull.) Ditmar 1809
DATA DI RACCOLTA 31.07.2024	LUOGO DI RACC. Stiozze	COMUNE Primiero S. Martino PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Conifere con Faggi		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenute su vecchie *Russula* (prob. *nigricans*) marcescenti.




MICROSCOPIA: Clamidospore verrucose spinose, 12.7-15.7 x 9.4-12.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL.FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2) – A.M.B.

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI (DETTAGLIO)

CLAMIDOSPORE

CLAMIDOSPORE

CLAMIDOSPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 1-2 cm di diametro, subsferico, cuticola asciutta con una densissima pruina di colore ocr-brunastro.

Lamelle rade, molto ridotte e malformate, di colore biancastro.

Gambo quasi inesistente, da biancastro ad ocraceo, ricoperto da una pruina biancastra.

Carne molto esigua, ocr pallida, con odore sgradevole di farina rancida.

Microscopia. Osservate solo clamidospore, verrucose spinose, di 12.7-15.7 x 9.4-12.6 μ .