

SCHEDA N° 0784 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Bolbitius</i>	SPECIE <i>titubans</i>	AUTORE (Bull.) Fr. 1838	
DATA DI RACCOLTA 19.04.2024	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1.5 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Carlo Montagna	

HABITAT:

☒ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☒ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 3 esemplari tra l'erba, su residui di eiezioni animali.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, con poro germinativo, 11.2-12.8 x 6.8-7.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : MOSER M. – GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI - SATURNIA

DETERMINATORE Carlo Montagna

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CHEILOCISTIDI

CAULOCISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo campanulato a conico-parabolico, di colore giallo-olivastro con venature brune, più chiaro al margine; debolmente solcato nella regione prossima all'orlo.

Lamelle sub-libere, di color cannella con filo biancastro.

Gambo cilindraceo e cavo, di colore giallo zolfo, biancastro nella parte inferiore, ornato di fibrille fiocose longitudinali.

Carne fragile, priva di odori o sapori specifici.

Microscopia. Spore ellissoidali, apicolate, con evidente poro germinativo, di 11.2-(12.23)-12.8 x 6.8-(7.3)-7.8 μ , con Q: 1.48-(1.68)-1.83; basidi tetrasporici, brevemente clavati; cheilocistidi per lo più cilindrico-ventricosi; caulocistidi polimorfi.

Nota. Secondo IndexFungorum l'attuale *Bolbitius titubans* accorpa le precedenti due varietà di *Bolbitius vitellinus* var. *fragilis* e *Bolbitius vitellinus* var. *titubans*.