

SCHEDA N° 0791 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE bovinus	AUTORE Fr. 1838	
DATA DI RACCOLTA 30.06.2024	LUOGO DI RACC. Lavarone	COMUNE Lavarone	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1250 m	I.G.M. 081-I	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI
 ☐ TERRENO NUDO
 ☐ TORBIERA
 ☐ ARGINE DI FIUME

☐ ORTI E GIARDINI
 ☐ TERRENO SABBIOSO
 ☐ TERRENO COLTIVATO A
 ☐ LUOGO BRUCIATO

☐ MARGINI DI STRADA
 ☐ ARENILE

☐ BOSCO SUBALPINO
 ☒ RADO
 ☐ FITTO

☒ DENTRO AL BOSCO
 ☐ AI MARGINI DEL BOSCO
 ☐ SU LEGNO
 ☐ VIVO
 ☐ MORTO
 DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA
 ☒ OMBROSA
 ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO
 ☐ MOLTO UMIDO
 ☐ UMIDO
 ☒ ASCIUTTO
 ☐ SECCO





VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :**NOTE :** Rinvenuti 6-8 esemplari vicini, sotto Abete rosso.

MICROSCOPIA: Spore da largamente ellissoidali a ovali, 6.8-9.2 x 5.0-6.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5) - MYCOLOGIA

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI
☒ FRESCHI
 ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

TERMINALI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di circa 5 cm di diametro nell'esemplare maggiore, da emisferico a convesso con ampio umbone ottuso; cuticola finemente fibrillosa, satinata, di colore bruno-rossastro; margine involuto.

Lamelle smarginate, intercalate a lamellule; di colore brunastro, con filo più chiaro, crenulato.

Gambo clavato-fusiforme; da biancastro a concolore al cappello (per presenza di bande longitudinali), zona anulare evidente, biancastra.

Carne soda, biancastra, imbrunente nel terzo inferiore; odore complesso, piuttosto intenso.

Microscopia. Spore da largamente ellissoidali a ovali, di 6.8-(8.1)-9.2 x 5.0-(5.79)-6.8 μ , con Q: 1.23-(1.4)-1.55; basidi clavati, tetrasporici; celle terminali settate, per lo più cilindrico-clavate; ife dell'epicute con disposizione periclinale, debolmente incrostate, dotate di GaF.