

SCHEDA N° 0800 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE caerulescens	AUTORE (Schaeff.) Fr. 1838	
DATA DI RACCOLTA 09.10.2024	LUOGO DI RACC. Val di Non	COMUNE Ton	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 500 m	I.G.M. 043-III	RACCOGLITORE Carlo Montagna	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Faggio (prevalente)		☐ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Faggio.

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, moderatamente verrucose, 8.1-10.0 x 4.9-5.6 µ.


BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. - FUNGI OF SWITZERLAND (5) - EDITION MYKOLOGIA (LUCERNA)

DETERMINATORE Carlo Montagna


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORO



SPORE



EL. TERMINALI



GAF

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo largamente emisferico con irregolare depressione centrale, di circa 5 cm di diametro; superficie liscia, di colore grigio-ocraceo con toni violetti (funghi anziani); margine sottile, ricurvo.

Lamelle grigio-bluastre, con filo crenulato più chiaro.

Stipite cilindrico, di colore grigio-violetto, con fibrille longitudinali ocracee; presente un ampio bulbo marginato.

Microscopia. Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, moderatamente verrucose, $8.1-(8.91)-10.0 \times 4.9-(5.29)-5.6 \mu$, Q: $1.44-(1.68)-1.83$; elementi marginali $11.0-18.0 \times 6.6-8.2 \mu$; presenti GaF.