

SCHEDA N° 0801 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE caroviolaceus	AUTORE P.D. Orton 1960	
DATA DI RACCOLTA 09.10.2024	LUOGO DI RACC. Val di Non	COMUNE Ton	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 500 m	I.G.M. 043-III	RACCOGLITORE Carlo Montagna	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Faggio (prevalente)		☐ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA



UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Faggio.

NOTE :
MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a debolmente citriformi, verrucose, 9.3-10.9 x 5.8-6.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : [HTTPS://WWW.MYCOCHARENTES.FR](https://www.mycocharentes.fr)
DETERMINATORE Carlo Montagna

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORO

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo largamente emisferico con depressione centrale, di circa 5 cm di diametro; superficie liscia, di colore ocraceo-brunastro (presenti larghe marezzature ocracee), più chiaro al margine; margine localmente fessurato.

Lamelle smarginate, di colore bruno-giallastro con riflessi violetti; filo marginale grigiastro.

Stipite cilindrico, flesso, di colore grigiastro, con rivestimento basale fibrilloso ocraceo; presente un ampio bulbo marginato.

Microscopia. Spore da ellissoidali a debolmente citriformi, verrucose, di $9.3-(10.01)-10.9 \times 5.8-(6.26)-6.7 \mu$, con Q: $1.46-(1.6)-1.77$; basidi clavati tetrasporici.