

SCHEDA N° 0788 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE phoeniceus	AUTORE (Bull.) Maire 1912	
DATA DI RACCOLTA 26.05.2024	LUOGO DI RACC. Laghetti del Venda	COMUNE Teolo	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 500 m	I.G.M. 147-IV	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Castagno (prevalente), Quercia, Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 8-9 esemplari vicini, sotto Quercia.





MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali ad amigdaliformi, debolmente verrucose, 6.0-7.8 x 4.0-5.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5) - MYCOLOGIA

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

TERMINALI

EPICUTE

EPICUTE (GAF)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di circa 5.5 cm di diametro nell'esemplare maggiore, da emisferico a campanulato (fungo adulto) con ampio umbone ottuso; cuticola finemente squamulosa, di colore bruno ruggine, localmente impallidente; margine involuto, sottile.

Lamelle smarginate, intercalate a lamellule; color rosso cupo, con filo irregolare.

Gambo cilindrico, per lo più flessuoso, con bulbo leggermente allargato e fusiforme; colore giallastro, con striature/bande rossastre per residui velari; micelio basale rosato.

Carne giallastra, con toni rossastri sotto la cuticola; odore da rafanoide a iodato.

Microscopia. Spore da ellissoidali ad amigdaliformi, debolmente verrucose, di 6.0-(6.43)-7.8 x 4.0-(4.23)-5.0 μ , con Q: 1.36-(1.52)-1.66; basidi clavati, tetrasporici; celle terminali settate, per lo più cilindrico-clavate, elementi finali 13.0-19.5 x 5.5-7.5 μ ; ife dell'epicute con disposizione periclinale, debolmente incrostate, dotate di GaF.

Nota. Nome secondo ISF: *Cortinarius purpureus*