

SCHEDA N° 0814 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE venetus	AUTORE (Fr.) Fr. 1838	
DATA DI RACCOLTA 07.09.2024	LUOGO DI RACC. Dismoni	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI

☐ TERRENO NUDO

☐ TORBIERA

☐ ARGINE DI FIUME

☒ DENTRO AL BOSCO

☐ SU LEGNO

☐ ORTI E GIARDINI

☐ TERRENO SABBIOSO

☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ LUOGO BRUCIATO

☐ AI MARGINI DEL BOSCO

☐ VIVO

☐ MORTO

DI

☐ MARGINI DI STRADA

☐ ARENILE

☒ BOSCO SUBALPINO

☒ RADO

☐ FITTO

☐ IN RADURE

BOSCO DI : Abete rosso

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Esemplari rinvenuti su letto di aghi.

MICROSCOPIA: Spore subsferiche, leggermente verrucose, 7.2 x 5.0 µ.


BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5) – ED. MYKOLOGIA (5)

DETERMINATORE Franco Manganelli


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORO



SPORE



SPORE E BASIDI



BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di 4-5 di diametro, emisferico, con un piccolo umbone ottuso; superficie finemente feltrata/squamulosa, verde giallastro/verde oliva, margine liscio, più pallido, con qualche appendice giallastra al bordo.

Lamelle molto fitte, inizialmente verde oliva, poi bruno rossastre, largamente adnate, con filo intero concolore.

Gambo cilindrico o leggermente clavato, biancastro, ricoperto da un finissimo velo verde oliva-giallastro, ornato di fibrille longitudinali.

Carne grigio-biancastra; odore leggermente rafanoide.

Microscopia. Spore subsferiche, leggermente verrucose (fuochettare), di $7.2 \times 5.0 \mu\text{m}$; polvere sporale ocrea-ruggine.