

SCHEDA N° 0815 AMS_PD
ORDINE Dacrymycetales

GENERE Dacrymyces	SPECIE variisporus	AUTORE McNabb 1973	
DATA DI RACCOLTA 26.07.2024	LUOGO DI RACC. Val Mesta	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Conifere		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI Abete Rosso

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti moltissimi esemplari riuniti in ciuffi su un tronco di Abete caduto e quasi marcescente.



MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, allantoidi, con 4-5 setti, 20.4 x 6.12 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN M. – FUNGI OF SWITZERLAND (2)

DETERMINATORE Carlo Montagna

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI

SPORE

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Carpoforo di 5-6 mm di diametro, orbicolare-lentiforme o cupuliforme, gelatinoso, unito in molti individui di colore giallastro che diventano arancione con l'essiccazione.

Gambo quasi inesistente.

Carne gelatinosa, nessun odore e sapore particolari; molto elastica, di colore giallastro.

Microscopia. Spore ellissoidali, allantoidi, con 4-5 setti, di 20.4 x 6.12 µm di grandezza.