

SCHEDA N° 0818 AMS_PD

ORDINE Lycoperdales

GENERE Geastrum	SPECIE sessile	AUTORE Pouzar 1971
DATA DI RACCOLTA 22.07.2024	LUOGO DI RACC. Malga Fossetta	COMUNE Primiero San Martino PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1450 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Abete rosso con Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Qualche cespuglio di Latifoglia.

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore rotondeggianti, verrucose, con diametro di 3µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. - ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE **Franco Manganelli**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



CARPOFORI



CARPOFORO (DETTAGLIO)



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Basidiocarpo di 4-5 cm di diametro, costituito da due strati: endo ed esoperidio; l'endoperidio, contenente la gleba, è globoso e sessile, a maturità si apre nella parte apicale con un foro regolare più o meno conico senza areola basale; la gleba è inizialmente bianca, poi scura; l'esoperidio si apre a forma di stella ed è suddiviso in 7-8 lacinie revolute con al centro l'endoperidio; le lacinie (revolute) inglobano molto substrato nella loro curvatura.

Carne tenace ed elastica quella delle lacinie, mentre quella dell'endoperidio è tenera e con il tempo polverulenta.

Microscopia. Spore rotondeggianti, verrucose, molto piccole: 3µm di diametro; polvere sporale brunastra.