

SCHEDA N° 0872 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Hebeloma</i>	SPECIE <i>quercetorum</i>	AUTORE <i>Quadr. 1993</i>	
DATA DI RACCOLTA 07.05.2024	LUOGO DI RACC. Valle Vecchia	COMUNE Brussa	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0.5 m	I.G.M. 129-I	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Macchia mediterranea con presenza di Leccio.



NOTE : Rinvenuti 6-7 esemplari in prossimità di Leccio.


MICROSCOPIA: Spore da amigdaliformi a citriformi, verrucose, destrinoidi, talora caliptrate, 9.4-11.2 x 5.4-6.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : GRILLI E., BEKER H.J., EBERHARDT U., SCHUTZ N. – HEBELOMA SUPPLEMENT

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

SPORE IN MELZER

BASIDI

CHEILOCISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello convesso, con largo e basso umbone; glabro, di colore ocraceo, più pallido nella regione marginale; cuticola viscida, con orlo privo di residui velari.

Imenio con lamelle smarginate, ventricose, alternate a lamellule, non lacrimanti; di colore iniziale biancastro, quindi ocraceo; filo lamellare biancastro.

Stipite cilindrico, con bulbo basale contenuto; biancastro, bruniccio alla base, marcatamente pruinoso specie nella regione superiore; in un esemplare presenza di stalattite.

Carne biancastra, imbrunente con l'età nella regione centrale dello stipite; senza odori particolari, sapore amarognolo.

Microscopia. Spore da amigdaliformi a citriformi, finemente verrucose, non molto destrinoidi, talora caliptrate, di $9.4-(10.37)-11.2 \times 5.4-(5.97)-6.7 \mu$, Q: $1.59-(1.74)-1.91$; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici; cheilocistidi polimorfi (in maggioranza cilindrici o cilindrico-ventricosi), talora ad apice lanceolato.