

SCHEDA N° 0820 AMS_PD
ORDINE Hydnnaceae

GENERE Hydnum	SPECIE repandum	AUTORE L. 1753	
DATA DI RACCOLTA 16.07.2024	LUOGO DI RACC. Stiozze	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Abete rosso e Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti tra erba e terreno nudo.

MICROSCOPIA: Spore obovoidi, lisce, 6.2-8.1 x 5.8-7.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B.

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Basidiocarpo pileato e stipitato, con cappello di 8-10 cm di diametro, molto irregolare, inizialmente convesso poi appianato o ombelicato; depresso centralmente, superficie secca e vellutata, di colore giallastro carnicino, a volte aranciata.

Imenoforo formato da aculei molto fragili, facilmente separabili, da biancastri a carnicino, a volte più aranciati.

Gambo spesso eccentrico, tozzo, a volte svasato alla base; con colore al cappello o quasi biancastro, al tocco vi è un leggero ingiallimento.

Carne bianca, cassante, a volte leggermente ingiallente; odore gradevole appena percepibile e sapore leggermente amarognolo.

Microscopia. Spore obovoidi, lisce, di 6.2-(7.12)-8.1 x 5.8-(6.5)-7.5 μ ; sporata bianco-crema.