

SCHEDA N° 0807 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Hygrophorus	SPECIE discoideus	AUTORE (Pers.) Fr. 1838	
DATA DI RACCOLTA 27.10.2024	LUOGO DI RACC. Cansiglio	COMUNE Tambre	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1000 m	I.G.M. 064-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Abete (prevalente Bianco) misto a Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti a gruppetti in una spianata.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, 6.2-7.6 x 3.7-4.8 µ.


BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2) – A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORI



SPORE



BASIDI(OLI)



GaF

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a convesso, con ampio umbone, orlo sottile, con velo fugace; cuticola vischioso-glutinosa, di colore ocraceo molto pallido, progressivamente imbrunente verso il centro.

Lamelle da adnate a subdecurrenti, arcuate, spesse, spaziate, irregolari, con lamellule; biancastre con sfumature ocracee pallide.

Stipite cilindrico, leggermente flessuoso, fioccoso all'apice; di colore biancastro, sfumato di ocraceo nella regione inferiore.

Carne biancastra, senza odore o sapore distintivi.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, di $6.2-(6.77)-7.6 \times 3.7-(4.32)-4.8 \mu$, con Q: $1.42-(1.57)-1.77$; basidi tetrasporici, cilindrici o appena clavati, $36.0-38.0 \times 4.8-6.5 \mu$, con GaF; cistidi assenti.