



SCHEDA N° 0797 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Inocybe	SPECIE fraudans	AUTORE (Britzelm.) Sacc. 1887
DATA DI RACCOLTA 28.08.2024	LUOGO DI RACC. Bosco di Ciaculla	COMUNE Comelico Superiore PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 018-III	RACCOGLITORE Franco Fratta
HABITAT:		
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	▼ TERRENO SABBIOSO ▼ TERRENO SAB	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete bianco, Pioppo,	Betulla	⊠ RADO ☐ FITTO
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBR	ROSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO	O MUMIDO ASCIUTTO SECCO
Note:		
MICROSCOPIA: Spore lisce, largar	mente amigdaliformi, a parete spessa, 8	3.7-10.3 x 6.0-6.7 μ.
Bibliografia : Stangl J. – Guida	ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI (3)) INOCYBE - SATURNIA
DETERMINATORE Carlo Montagn	RILIEVI EFFETT	SUATION DEPOSIT. SPECCH. Marcall
		TUATI SU REPERTI
CARPOFORI	SPORE	CISTIDI





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello conico-campanulato, leggermente umbonato, percorso da sottili fibrille radiali, di colore ocraceo, più chiaro al margine; bordo inflesso, con resti evidenti di velo (funghi giovani).

Lamelle non molto fitte, di color beige, con filo chiaro irregolare.

Gambo cilindrico, leggermente flessuoso, un po' allargato nella regione inferiore; di colore biancastro, percorso da sottili fibre biancastre; base allargata, debolmente arrossante.

Carne fibrosa, biancastra, leggermente arrossante al taglio; odore fruttato, sapore debole.

Microscopia. Spore lisce, largamente amigdaliformi, a parete spessa, talora apicolate, di 8.7-(7.75)-10.3 x 6.0-(6.36)-6.7 μ, con Q: 1.26-(1.47)-1.66; basidi clavati, tetrasporici; cistidi da fusiformi, a ventricoli, con parete spessa, per lo più muricati, caulocistidi assenti.