

SCHEDA N° 0785 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Inocybe</i>	SPECIE <i>griseovellata</i>	AUTORE Kühner 1955	
DATA DI RACCOLTA 07.04.2024	LUOGO DI RACC. Valle Vecchia	COMUNE Brussa	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 129-I	RACCOGLITORE Carlo Montagna	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☒ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Pino sp, Leccio, Pioppo, Robinia		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Esemplari rinvenuti lungo un sentiero delimitato da Leccio, Robinia e qualche Pino.

MICROSCOPIA: Spore lisce, 10.0-11.8 x 5.6-6.9 µ.


BIBLIOGRAFIA : STANGL J. – GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI (3) INOCYBE - SATURNIA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI



CARPOFORI




SPORE



CHEILOCISTIDI



CAULOCISTIDI



PELI STIPITALI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello emisferico con apice appianato (funghi giovani), di colore bruno scuro, più chiaro al margine, dove si presenta un po' fibroso; bordo leggermente inflesso, con presente labile cortina; apice ricoperto da un velo grigiastro.

Lamelle non molto fitte, arcuate, di color beige, con filo chiaro (cigliato).

Gambo cilindrico, leggermente flessuoso nella regione inferiore; di colore brunastro, coperto da fibre spesse biancastre; base allargata, ricoperta da feltro miceliare bianco.

Carne fibrosa, biancastra; odore non significativo.

Microscopia. Spore lisce, subellissoidali, di $10.0-(10.52)-11.8 \times 5.6-(6.28)-6.9 \mu$, con Q: $1.58-(1.73)-1.87$; basidi clavati, tetrasporici; cistidi strettamente fusiformi, a parete spessa, muricati, di circa $52.0 \times 13.5 \mu$; presenti pochi caulocistidi; peli stipitali dotati di GaF.