



SCHEDA N° 0799 AMS_PD

ORDINE Russulales

GENERE Lactarius	SPECIE ilicis	SPECIE ilicis AUTORE Sarnari 1993		
DATA DI RACCOLTA 29.09.2024	LUOGO DI RACC. S. Carlo	COMUNE Padova	Prov. PD	
ALTITUDINE S.L.M. 15 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Franco Fratt	a	
HABITAT:				
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA		
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE		
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A			
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO		
BOSCO DI:		☐ RADO	☐ FITTO	
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE		
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI		
ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA				
UMIDITA' DEL TERRENO				
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:				
NOTE: Rinvenuti numerosi esen	aplari in una aiuola con sei Lecci.			
MICROSCOPIA: Spore largamente ellissoidali, 6.7-8.0 x 5.9-7.0 μ.				
Bibliografia: Galli R. – I Lattari – Ed. dalla Natura				
DETERMINATORE Franco Fratta RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI				
CARPOFORI	SPORE	B	ASIDI	





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 5-7 cm di diametro, ben zonato sull'orlo involuto e in periferia, meno al disco, depresso; l'orlo, anche lobato e ondulato, presenta al margine un'evidente villosità biancastra; colore di base ocra con componenti giallastre e chiazze più cariche; vischiosetto, con resti di terriccio e altro ancora.

Lamelle basse, biancastre, fitte, adnate; di colore crema pallido; lattice bianco da isolato, tendente al fulvastro da secco.

Gambo cortissimo, 20-30 x 12-15 mm, biancastro, con qualche piccolo scrobicolo; fulvastro alla manipolazione nella parte inferiore.

Carne soda, crema-biancastra, tendente al fulvo sotto la corteccia del gambo; odore complesso, poco gradevole, sapore acre.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, di 6.7-(7.51)-8.0 x 5.9-(6.51)-7.0 μ, con Q: 1.07-(1.16)-1.25; basidi clavati, tetrasporici; cistidi subcilindrici, attenuati all'apice, per lo più moniliformi; ife dell'epicute sottili, intrecciate, debolmente incrostate.