

SCHEDA N° 0821 AMS_PD
ORDINE Russulales

GENERE Lactarius	SPECIE pergamenus	AUTORE (Sw.) Fr. 1838	
DATA DI RACCOLTA 03.08.2024	LUOGO DI RACC. Passo Cereda	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1400 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:




☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: <u>Abete rosso e Faggi</u>		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Vari cespugli di Latifoglie.
NOTE: Rinvenuti diversi esemplari quasi sotterrati.
MICROSCOPIA: Spore subglobose o leggermente ellissoidali, 7.0 x 6.0 µ.
BIBLIOGRAFIA: PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (I) – A.M.B.
DETERMINATORE Franco Manganelli
RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORO

REAZIONE LATICE CON KOH

BASIDI - CISTIDI

SPORE

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello crateriforme, bianco con diverse sfumature brunastre, soprattutto dopo manipolazione; orlo involuto, margine lobato; cuticola adnata e liscia con piccole zone screpolate.

Lamelle fitte, basse, bianco avorio con macchie brunastre, anche queste alla manipolazione.

Gambo cilindrico, tozzo, pieno poi farcito; rugoso, bianco, si macchia di bruno rossiccio nella parte basale.

Carne spessa, soda, bianca al taglio, ma virante a grigio-verdastro dopo parecchio tempo.

Latice abbondante, acre-bruciante, immutabile se isolato, verde-grigiastro sulle lamelle; con KOH dà una colorazione caratteristica molto vivace di rosso vermiglio.

Microscopia. Spore subglobose o leggermente ellissoidali, di 7.0 x 6.0 µm di grandezza.