

SCHEDA N° 0795 AMS_PD

ORDINE Russulales

GENERE Lactarius	SPECIE uvidus	AUTORE (Fr.) Fr. 1838	
DATA DI RACCOLTA 28.08.2024	LUOGO DI RACC. Padola	COMUNE Comelico Superiore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1350 m	I.G.M. 018-III	RACCOGLITORE Carlo Montagna	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI
☐ TERRENO NUDO
☐ TORBIERA
☐ ARGINE DI FIUME

☐ ORTI E GIARDINI
☐ TERRENO SABBIOSO
☐ TERRENO COLTIVATO A
☐ LUOGO BRUCIATO

☐ MARGINI DI STRADA
☐ ARENILE

BOSCO DI : **Aghifoglia con qualche Faggio**

☒ DENTRO AL BOSCO
☐ SU LEGNO

☐ AI MARGINI DEL BOSCO
☐ VIVO
☐ MORTO

☒ BOSCO SUBALPINO
☒ RADO
☐ FITTO

☐ IN RADURE

DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA
☒ OMBROSA
☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO
☐ MOLTO UMIDO
☒ UMIDO
☐ ASCIUTTO
☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuti tre esemplari tra il muschio.**

MICROSCOPIA: **Spore largamente ellissoidali, con creste incomplete, amiloidi, 8.5-9.6 x 7.5-8.1 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **KRANZLIN F. –FUNGI OF SWITZERLAND (6) - MYKOLOGIA**


DETERMINATORE **Carlo Montagna**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI


☐ FRESCHI
☒ SECCHI




CARPOFORI



SPORE



BASIDI



CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano-convesso, con depressione centrale, di circa 6 cm di diametro nell'esemplare più grande; margine sottile, regolare; superficie vischiosa, di colore crema-lilla, localmente più scuro al centro in modo irregolare.

Lamelle subdecorrenti, sottili, forcate; di colore crema pallido, con sfumature lilla, brunastre al tocco; filo intero; lattice piuttosto scarso, inizialmente biancastro, quindi lilla-bruno sulle lamelle.

Stipite cilindrico, slanciato, ingrossato nella parte inferiore, da midolloso a cavo; da biancastro a crema pallido, vischioso, con riflessi lilacini.

Carne poco spessa, midolloso, biancastra (ocracea alla base), virante al violetto al taglio; odore debole, sapore leggermente acre.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, con creste incomplete, amiloidi, di 8.5-(9.2)-9.6 x 7.5-(7.7)-8.1 μ , con Q: 1.13-(1.19)-1.27; basidi clavati, tetrasporici; cistidi lungamente fusiformi, talora mucronati, 60-70 x 9-12 μ .