

SCHEDA N° 0822 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE Leccinum	SPECIE piceinum	AUTORE Pilát & Dermek 1974	
DATA DI RACCOLTA 22.07.2024	LUOGO DI RACC. Val Mesta	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI

☐ TERRENO NUDO

☐ TORBIERA

☐ ARGINE DI FIUME

☐ ORTI E GIARDINI

☐ TERRENO SABBIOSO

☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ LUOGO BRUCIATO

☐ MARGINI DI STRADA

☐ ARENILE

☒ BOSCO SUBALPINO

☒ RADO

☐ FITTO

☒ DENTRO AL BOSCO

☐ SU LEGNO

☐ AI MARGINI DEL BOSCO

☐ VIVO

☐ MORTO

DI

☐ ASSOLATA

☐ OMBROSA

☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO

☐ MOLTO UMIDO

☒ UMIDO

☐ ASCIUTTO

☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :



ESPOSIZIONE:

NOTE : Rinvenuti due soli esemplari in una zona coperta completamente da muschio.

MICROSCOPIA: Spore fusiformi, 10.5 x 3.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (I) – A.M.B.

DETERMINATORE **Franco Manganelli**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

 CARPOFORO	 STIPITE	 IMENIO
 ELEMENTI IMENIALI	 SPORE	

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello subgloboso-convesso con orlo appendicolato; superficie vellutata o feltrata, cuticola aranciata-brunastra ricoperta da squamule concolori o più scurette.

Tuboli quasi liberi al gambo, molto alti e di colore grigio-biancastri; pori molto piccoli, rotondi, concolori ai tuboli, che si macchiano al tocco di grigio-brunastro.

Gambo quasi cilindrico, leggermente dilatato verso la base, ricoperto da squamule fitte e di colore grigio-nerastre fin da giovane.

Carne soda, abbondante, fibrosa nel gambo; al taglio vira verso un grigio-lilla all'inizio, poi verso un viola nerastro; non ha né sapori né odori significativi.

Microscopia. Spore fusiformi, di 10.5 x 3.5 µm di grandezza; sporata olivastrea.