



SCHEDA N° 0810 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

		T	
GENERE Lepista	SPECIE inversa	AUTORE (Scop.) Pat. 1887	
DATA DI RACCOLTA 09.11.2024	LUOGO DI RACC. Sant'Elena	COMUNE Monselice	Prov. PD
ALTITUDINE S.L.M. 300 m	I.G.M. 146-II	RACCOGLITORE Vitaliano Mi	lanese
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA	
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	ARENILE	
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI:		☐ RADO	☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	□ VIVO □ MORTO	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBE	ROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO	O 🛛 UMIDO 🔲 ASCIUTTO	☐ SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Alb	eri di Tasso		
Note: Rinvenuti 2 gruppi di 5-6	esemplari ciascuno in prossimità di u	n laghetto.	
MICROSCOPIA: Spore ellissoidali,	verrucose, 3.7-4.3 x 2.8-3.8 μ.		
BIBLIOGRAFIA: PAPETTI C., CONSI	GLIO G., SIMONINI G., ATL. FOTOGRAF	ICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M	Л.В.
DETERMINATORE Vitaliano Milan	ese	_	
	RILIEVI EFFET	TUATI SU REPERTI X FRESCHI	☐ SECCHI
CARPOFORI	SPORE		BASIDI





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da depresso a imbutiforme, di circa 4 cm di diametro; cuticola liscia, untuosa (ambiente umido), con fibrille radiali, di colore arancio-fulvo, più scuro nella regione centrale; orlo involuto, sottile, un po' ondulato.

Lamelle fortemente decorrenti, fitte, intercalate a lamellule; di colore crema sfumato di arancio.

Stipite cilindrico, un po' allargato alla base; corteccia fibrillosa, di colore biancastro con fibrillature con colori al cappello; feltro miceliare biancastro alla base, inglobante il substrato.

Carne fibrosa, tenace, di colore crema; odore aromatico.

Microscopia. Spore ellissoidali, verrucose, di 3.7-(3.98)- 4.3×2.8 -(3.35)- 3.8μ , con Q: 1,07-(1.2)-1,39; basidi (bi) e tetrasporici, cilindrico-clavati.