

SCHEDA N° 0798 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Lyophyllum	SPECIE infumatum	AUTORE (Bres.) Kühner 1938	
DATA DI RACCOLTA 28.08.2024	LUOGO DI RACC. Bosco di Ciaculla	COMUNE Comelico Superiore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 018-III	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI
☐ TERRENO NUDO
☐ TORBIERA
☐ ARGINE DI FIUME

☐ ORTI E GIARDINI
☐ TERRENO SABBIOSO
☐ TERRENO COLTIVATO A
☐ LUOGO BRUCIATO

☐ MARGINI DI STRADA
☐ ARENILE

BOSCO DI : **Abete bianco, Pioppo, Betulla**

☒ DENTRO AL BOSCO
☐ SU LEGNO

☐ AI MARGINI DEL BOSCO
☐ VIVO
☐ MORTO

DI

☒ BOSCO SUBALPINO
☒ RADO
☐ FITTO
☐ IN RADURE

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA
☒ OMBROSA
☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO
☐ MOLTO UMIDO
☒ UMIDO
☐ ASCIUTTO
☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuti tre esemplari relativamente vicini, tra l'erba.**


MICROSCOPIA: **Spore da ovoidi-angolose a romboidali, guttulate, 8.1-10.8 x 4.9-7.0 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D’ITALIA (1) – A.M.B.**


DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI
☒ FRESCHI
☐ SECCHI


CARPOFORI



SPORE



EPICUTE (GAF)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo convesso, dotato di basso umbone; cuticola opaca, fibrillosa, di colore bruno, appena più chiaro margine; orlo sottile, ondulato.

Imenio con lamelle da adnate a debolmente decorrenti, con lamellule, bianco-grigiastre, alla frattura prima bluastre quindi annerenti; filo lamellare irregolare.

Stipite cilindrico, allargato alla base; fibrilloso, longitudinalmente rugoloso, da biancastro a brunastro.

Carne biancastra, annerente all'aria; odore terroso.

Microscopia. Spore da ovoidi-angolose a romboidali, guttulate, di 8.1-(9.57)-10.8 x 4.9-(5.88)-7.0 μ , con Q: 1.4-(1.63)-1.76; basidi clavati, tetrasporici; epicute costituita da ife cilindriche, a terminali irregolari, rugolose; frequenti GaF.