

SCHEDA N° 0823 AMS_PD

ORDINE Agaricales

GENERE Marasmius	SPECIE scorodonius	AUTORE (Fr.) Fr. 1836	
DATA DI RACCOLTA 06.09.2024	LUOGO DI RACC. Cenquei	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1000 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Conifere con qualche Faggio		☒ RADO ☒ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Diversi cespugli di Latifoglie.**

NOTE : **Rinvenuti centinaia di esemplari.**

MICROSCOPIA: **Spore ellissoidali, 8,5-9,0 x 4,0-4,5 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B.**

DETERMINATORE **Franco Manganelli**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI E CISTIDI



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di un paio di cm di diametro, spianato con una leggera depressione centrale; con leggero umbone ottuso e con orlo revoluto, cuticola liscia, striata e leggermente igrofana, di colore bianco-brunastro, leggermente più scuro al disco.

Lamelle libere, spaziate, con qualche lamellula, di colore biancastro con qualche riflesso rosato.

Gambo cilindrico o leggermente ingrossato in alto, di aspetto coriaceo e di colore quasi rossastro.

Carne molto sottile, nel cappello bianca, con forte odore agliaceo così come nel sapore.

Microscopia. Spore ellissoidali, di 8.5-9.0 x 4.0-4.5 µm di grandezza.