

SCHEDA N° 0781 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Melanoleuca	SPECIE brevipes	AUTORE (Bull.) Pat. 1900	
DATA DI RACCOLTA 07.04.2024	LUOGO DI RACC. Valle Vecchia	COMUNE Brussa	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0.5 m	I.G.M. 129-I	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☒ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Macchia mediterranea con Leccio.**

NOTE :

MICROSCOPIA: **Spore ellittiche, irregolarmente verrucose, 6,4-8,2 x 4,3-6,1 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **BON M. – FLORE MYCOLOGIQUE D'EUROPE (2). LES TRICHOLOMES ET RESSEMBLANTS – ST. VALERY**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORO




CARPOFORI IN SEZIONE



SPORE



BASIDI



CHEILOCISTITIDI



CAULOCISTITIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di 8 cm di diametro nell'esemplare maggiore, appiattito, con basso umbone centrale; superficie liscia, bruno-grigiastra, con il centro più scuro (nerastro); margine sottile.

Lamelle piuttosto fitte, alternate a lamellule, adnato-smarginate; di colore biancastro, poi con toni crema; filo lamellare irregolare.

Gambo cilindrico, con un leggero bulbo alla base; con colore al cappello, biancastro nella regione basale e più chiaro in quella sovra-anulare, percorso da fibrille longitudinali.

Carne brunastra per tutta l'estensione dello stipite; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore ellittiche, irregolarmente verrucose, di $6.4-(7.2)-8.2 \times 4.3-(5.11)-6.1 \mu$, con Q: $1.22-(1.42)-1.6$; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici; cheilocistidi a pelo d'ortica, talora muricati; caulocistidi cilindrico-clavati nel primo terzo superiore dello stipite.