



## SCHEDA N° 0787 AMS\_PD

## **ORDINE Pluteales**

GENERE Pluteus	ECIE chrysophaeus AUTORE (Schaeff.) Quél. 1872		
DATA DI RACCOLTA 05.05.2024	LUOGO DI RACC. Laghetti del Venda	COMUNE Vò	Prov. PD
ALTITUDINE S.L.M. 600 m	I.G.M. 147-IV	RACCOGLITORE Franco	Fratta
HABITAT:		<del></del>	
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STI	RADA
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	<b>ARENILE</b>	
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A		
☐ ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALP	INO
BOSCO DI: Latifoglia		☐ RADO	☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	☐ vivo ☐ morto	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMB	ROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMII	O 🛮 UMIDO 🔲 ASCIU	TTO SECCO
NOTE: Rinvenuti 5-6 esemplari i	ru residui legnosi.		
MICROSCOPIA: Spore subglobose,	5.3-6.3 x 4.5-5.8 μ.		
	ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI –	SATURNIA	
DETERMINATORE Vitaliano Milan	959		
DETERMINATIONE VIGARIO VIRGI	RILIEVI EFFET	TUATI SU REPERTI 🔀 FRESO	сні 🔲 ѕессні
CARPOFORI	SPORE		CISTIDI





## DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** campanulato, di circa 3 cm di diametro nell'esemplare più grande, con basso umbone appena accennato; superficie rugolosa, più marcatamente nella regione apicale, di colore giallo senape; margine sottile, a lungo involuto.

Lamelle libere, un po' ventricose, intercalate a lamellule; biancastre, con filo regolare.

**Stipite** cilindrico, un po' allargato alla base; di colore biancastro/crema pallido, più scuro alla base (dove compaiono toni giallastri), percorso da fibrille per tutta la lunghezza.

Carne biancastra, con (debole) odore grato e sapore non significativo.

**Microscopia.** Spore subglobose, lisce, di 5.3-(5.76)-6.3 x 4.5-(5.15)-5.8  $\mu$ , con Q: 1.03-(1.11)-1.22; basidi clavati, tetrasporici; cistidi ventricosi, a parete liscia, con apice arrotondato, in taluni casi con 2-3 brevi cuspidi, 66.0-74.0 x 18.5-21.5  $\mu$ ; epicute con elementi da largamente clavati a piriformi.