

SCHEDA N° 0794 AMS_PD
ORDINE Entolomatales

GENERE <i>Rhodocybe</i>	SPECIE <i>fallax</i>	AUTORE (Quél.) Singer 1946	
DATA DI RACCOLTA 18.06.2023	LUOGO DI RACC. Asiago	COMUNE Asiago	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 1100 m	I.G.M. 082-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Aghifoglia, nettamente prevalente Abete rosso		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 3 esemplari nel muschio sotto Abete rosso.




MICROSCOPIA: Spore largamente ellittico-ovoidali, con superficie verrucoso-tuberculata, 6.5-9.8 x 3.6-4.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F – FUNGI OF SWITZERLAND (4)

CONTU M. – ECOLOGIA E TASSONOMIA DEL GENERE RHODOCYBE R. MAIRE IN SARDEGNA – REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA (22)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo convesso, quindi con depressione centrale, di circa 4 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola liscia, di colore grigiastro; margine sottile, irregolare, a lungo involuto.

Lamelle decorrenti, fitte, con lamellule, di colore grigio-ocraceo; filo irregolare.

Stipite cilindrico, dilatato nella parte inferiore, in un esemplare ricurvo; concolore al cappello, con fibrille longitudinali bruno-nerastre nella tre quarti inferiore, base bambagiosa per presenza di feltro miceliare biancastro.

Microscopia. Spore largamente ellittico-ovoidali, con superficie verrucoso-tuberculata, 6.5-(8.55)-9.9 x 3.6-(4.24)-4.6 μ , con Q: 1.6-(2.02)-2.32; basidi da lungamente clavati a cilindrici, tetrasporici, 33.0-38.0 x 4.5-6.0 μ ; epicute costituita da fasci di ife periclinali incrostate (debolmente intrecciate), prive di GaF.

Reazioni macroscopiche

Cuticola + KOH $\rightarrow$ Nullo (su secco)