

SCHEDA N° 0824 AMS_PD

ORDINE Russulales

GENERE Russula	SPECIE <i>delica</i>	AUTORE Fr. 1838	
DATA DI RACCOLTA 28.05.2024	LUOGO DI RACC. Brusegana	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 147-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☒ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Alberi di Tiglio e un Abete Rosso.

NOTE : Rinvenuti molti esemplari in diversi stadi di sviluppo.

MICROSCOPIA: Spore quasi ovoidali, con verruche prominenti, formanti un reticolo poco visibile, 9.18 x 8.16 µ.

BIBLIOGRAFIA : SARNARI M. – RUSSULE D'EUROPA (1) – A.M.B.
GALLI R. – LE RUSSULE - EdNATURA

DETERMINATORE Franco Manganelli


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORI



CARPOFORI



SPORATA



SPORE



SPORE (ORNAMENTAZIONE)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello prima quasi emisferico, poi convesso con fossetta eccentrica, orlo ondulato, lobato; forma quasi imbutiforme, con margine ricurvo e liscio; superficie rugolosa, con abbondante terriccio attaccato e difficilmente asportabile; colore biancastro con sfumature oca-brunastre anche molto ampie.

Lamelle bianche con sfumature crema, distanziate e con diverse lamellule; leggermente decorrenti al gambo.

Gambo tozzo e molto corto (3-4 cm) a fronte del cappello che raggiunge anche 10-12 cm di diametro; bianco puro, imbrunente al tocco.

Carne bianca con imbrunimento se esposta all'aria; odore acidulo-salmastro, poco gradevole, sapore quasi dolce; sulle lamelle prima amarotica poi piccante (col tempo decisamente piccante).

Microscopia. Spore quasi ovoidali, con verruche prominenti, formanti un reticolo poco visibile (microscopio ottico), di $9.18 \times 8.16 \mu\text{m}$; sporata quasi bianca.

Reazioni macrochimiche

Carne con tintura di guaiaco → verde azzurrino

Carne con solfato ferroso → rosato appena accennato