



SCHEDA N° 0825 AMS_PD

ORDINE Russulales

GENERE Russula	SPECIE farinipes	AUTORE Romell 1893
DATA DI RACCOLTA 31.07.2024	LUOGO DI RACC. Le Boiole	COMUNE Primiero S. Martino PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 850 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli
HABITAT:		5 1
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Diverse latifoglie con	qualche Abete rosso	⊠ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBRO	OSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO		
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:		
Note: Rinvenuti due soli esemplari.		
MICROSCOPIA: Spore quasi subovoidali, di circa 7 μm.		
BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PA	PETTI C., ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGH	II D'ITALIA (3) – A,M.B.
DETERMINATORE Franco Mangar	nelli Rilievi effettu	UATI SU REPERTI
CARPOFORI	LAMELLE	LAMELLE
	SPORE	SPORE





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 4-5 cm di diametro, quasi spianato con centro quasi depresso; margine irregolare e nettamente solcato; cuticola adnata e di colore giallo-pallido-ocracea.

Lamelle spaziate, lievemente decorrenti, inizialmente bianche poi crema, con filo intero.

Gambo cilindrico, leggermente ingrossato alla base, di colore bianco poi crema sporco.

Carne bianca, con odore fruttato e sapore dolciastro.

Microscopia. Spore quasi subovoidali, di circa 7 μm di grandezza, ornamentate da spinette; sporata bianca.

Reazioni chimiche

Carne + FeSO4 → grigio rosato

Carne + Guaiaco → verde-azzurrino molto lento