

SCHEDA N° 0786 AMS_PD
ORDINE Russulales

GENERE Russula	SPECIE gracillima	AUTORE Jul. Schaff. 1931	
DATA DI RACCOLTA 11.08.2023	LUOGO DI RACC. S. Osvaldo	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 980 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso, Pinus sp., Betulla		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Abete rosso, qualche Faggio e Betulla.


NOTE: Rinvenuti 2 esemplari adulti.



MICROSCOPIA: Spore subovoidali, echinulate, con verruche coniche amiloidi, isolate, 6.9-8.0 x 5.8-6.7 µm.

BIBLIOGRAFIA: SARNARI M. – RUSSULE D'EUROPA (1)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CHEILOCISTIDI

DERMATOCISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di 3.5 cm di diametro, piano-convesso, con contenuta depressione centrale, leggermente umbonato; cuticola asciutta, di colore rosa incarnato, giallo-ocraceo al centro; margine involuto, regolare.

Lamelle attenuate, talora forcate, intervenose sul fondo; inizialmente biancastre, quindi crema pallido.

Gambo cilindrico, piuttosto fragile, svasato nella parte inferiore; biancastro (con leggeri toni rosati), con rugosità grigiastre per tutta l'estensione; toni giallastri alla base nell'esemplare più anziano.

Carne biancastra, odore appena fruttato, sapore piuttosto acre.

Miscoscopia. Spore subovoidali, echinulate, con verruche coniche amiloidi, isolate, di 6.9-(7.5)-8.0 x 5.8-(6.23)-6.7 μ , con Q: 1.08-(1.2)-1.31; basidi clavati, tetrasporici; cistidi fusiformi, per lo più appendicolari, 45-50 x 10-11 μ ; dermatocistidi cilindrico-clavati, con apice arrotondato, talora settati, brunastri in SV.