



SCHEDA N° 0802 AMS_PD

ORDINE Russulales

	SPECIE praetervisa	AUTORE Sarnari 1998	
DATA DI RACCOLTA 20.10.2024	LUOGO DI RACC. Padova	COMUNE Padova Prov. PD	
ALTITUDINE S.L.M. 15 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Franco Fratta	
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA	
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO	
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
☐ SU LEGNO	□ VIVO □ MORTO	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMI	BROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMII	DO UMIDO SECCO	
NOTE: Esemplar rinvenuti in an	ipia aiuola cittadina, sotto Leccio.		
MICROSCOPIA: Spore largamente	ellissoidali, bassamente echinulate, d	ebolmente connesse da reticoli, 7.0-8.3 x 5.3-6.8 μ.	
BIBLIOGRAFIA: KRANZLIN F. – FU	ngi of Switzerland (6) - Mycologi	A	
DETERMINATORE Vitaliano Milan	ese RILIEVI EFFE	TTUATI SU REPERTI 🔲 FRESCHI 🗵 SECCHI	
CARPOFORI	SPORE	CISTIDI	





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo subemisferico con depressione discale imbutiforme, di circa 4 cm di diametro nell'esemplare maggiore, cuticola ocra-brunastra, con fini rugosità; orlo sottile, scanalato-tubercolato.

Lamelle da adnate ad arrotondate al gambo (o appena decorrenti), frequentemente biforcate, di colore crema-biancastro; filo regolare.

Stipite cilindrico, spugnoso, finemente rugoloso; biancastro con locali marezzature ocracee, in alcuni esemplari con fiammature rossastre alla base.

Carne fragile, biancastra, sfumata di ocraceo; odore non particolarmente sgradevole, sapore un po' amarognolo.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, bassamente echinulate con spine coniche, debolmente connesse da bassi reticoli, di 7.0-(7.21)-8.3 x 5.3-(5.96)-6.8 μ, con Q: 1.1-(1.17)-1.35; cistidi moniliformi, con apice arrotondato; epicute con ife sottili e flessuose.