

SCHEDA N° 0792 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Tricholoma	SPECIE psammopus	AUTORE (Kalchbr.) Quél. 1875	
DATA DI RACCOLTA 30.06.2024	LUOGO DI RACC. Lavarone	COMUNE Lavarone	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 081-I	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Abete rosso (prevalente), Faggio, Larice, Nocciolo		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuto un esemplare isolato in prossimità di conifera (Abete rosso e Larice).

MICROSCOPIA: Spore largamente ellissoidali, con guttula centrale, 4.9-6.2 x 3.3-4.6 µ.


BIBLIOGRAFIA : GALLI R., I TRICOLOMI – DALLA NATURA

DETERMINATORE **Franco Fratta**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI



IFE STIPITE SUP.

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a convesso, con largo umbone, di circa 3 cm di diametro; cuticola asciutta, dissociata in squamule, di colore ocraceo; orlo involuto, regolare.

Imenoforo a lamelle smarginate, alternate a lamellule, piuttosto spaziate; di colore iniziale bianco-ocraceo; filo regolare.

Stipite cilindrico, con colore al cappello, più chiaro nella parte superiore, ricoperto al di sotto da granulazioni brunastre.

Carne bianco-brunastra; odore e sapore poco significativi.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, con guttula centrale, di 4.9-(5.6)-6.2 x 3.3-(4.07)-4.6 μ , con Q: 1.14-(1.37)-1.59; basidi cilindrico-clavati, (bi-) e tetrasporici; ife della sommità stipitale cilindrico-clavate, talora bifide, prive di GaF.