FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0431 AMS_PD

ORDINE Agaricales

GENERE **Agaricus**	SPECIE **gennadii**	AUTORE **(Chatin & Boud.) P.D. Orton**	
DATA DI RACCOLTA **22.09.2017**	LUOGO DI RACC. **Parco**	COMUNE **Battaglia Terme**	PROV. **PD**
ALTITUDINE S.L.M. **12 m**	I.G.M. **147-III**	RACCOGLITORE **Vitaliano Milanese**	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☒ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : ☐ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Prevalenti Quercia, Sequoia sp., Cedro.**

NOTE : **Rinvenuti 2 esemplari vicini tra loro sul bordo di un laghetto (terreno sabbioso).**

MICROSCOPIA: **Spore largamente ellissoidali, a contenuto granulare, 6.6-8.3 x 5.1-6.2 µ.**

BIBLIOGRAFIA : PARRA SANCHEZ L., A. – AGARICUS L. – FUNGI EUROPAEI – ED. CANDUSSO

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI



SPORE



BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo piano-convesso, con leggera depressione centrale, di circa 6 cm di diametro; cuticola asciutta, sericea, di colore crema-ocraceo su sfondo biancastro, finemente squamulosa, un po' debordante al margine; margine sottile.

Imenoforo a lamelle fitte, libere al gambo, alternata a numerose lamellule; di colore grigio-rosato sporco; filo lamellare chiaro.

Stipite cilindrico, pieno, con base appuntita; asciutto, di colore inizialmente bianco, quindi crema-rosato; squamule biancastre nella regione superiore; **anello** infero, relativamente consistente, simulante una pseudovolva basale.

Carne compatta, bianca e immutabile; odore e sapore fungini.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, lisce, apicolate, a contenuto granulare, di 6.6-(7.18)-8.3 x 5.1-(5.61)-6.2 µ, con Q: 1.23-(1.28)-1.35; basidi tetrasporici, clavati, fino a 40.0 x 12.0 µ.