

SCHEMA N° 0846 AMS_PD
ORDINE Boletales

GENERE Boletus	SPECIE torosus	AUTORE Fr. 1835	
DATA DI RACCOLTA 29.06.2025	LUOGO DI RACC. Bertoldi	COMUNE Lavarone	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 900 m	I.G.M. 060-I	RACCOLTITORE F. Fratta - C. Montagna	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Aghifoglie miste a Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 7-8 esemplari in prossimità di Faggi.



MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a fusiformi, lisce, guttulate, a parete spessa, 11.2-14.2 x 4.3-6.1 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3) – A.M.B.

DETERMINATORE F. Fratta - C. Montagna

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

VIRAGGIO

SPORE

IFE EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a convesso, di circa 6-7 cm di diametro, con orlo involuto quindi acuto; cuticola da vellutata a glabra, grigio-olivastra, al contatto bluastra quindi rosso vinoso.

Pori piccoli, di colore giallo, con sfumature rossastre alla pressione.

Stipite sodo, allargato alla base; di colore giallo, rossastro alla base, con reticolo a maglie larghe esteso a tutta la superficie, viraggio rapido al blu e successiva stabilizzazione al rossastro dove lesionato.

Carne compatta e soda, gialla, vira istantaneamente al blu scuro passando per il rosso vinoso; odore presente ma non specifico.

Microscopia. Spore da ellissoidali a fusiformi, lisce, guttulate, a parete spessa, di 11.2-(12.81)-14.2 x 4.3-(5.35)-6.1 μ , con Q: 2.18-(2.41)-2.85; ife dell'epicute cilindriche, settate, con apice arrotondato.