

SCHEDA N° 0859 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Collybia	SPECIE distorta	AUTORE (Fr.) Quél. 1872	
DATA DI RACCOLTA 04.07.2025	LUOGO DI RACC. Val Mesta	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Conifere		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Qualche cespuglio di latifoglie.


NOTE: Rinvenuti quattro esemplari.

MICROSCOPIA: Spore subglobose, 4,0 x 3,5 µ.

BIBLIOGRAFIA: CONSIGLIO G., PAPETTI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

IMENIO

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di 4-5 cm di diametro, piano convesso, con ampio umbone; la cuticola si presenta glabra, con una leggerissima igrofaneità, uniformemente colorata di castano chiaro; margine liscio ed involuto.

Lamelle uncinato, fitte, di colore biancastro, con qualche macchia brunastra.

Gambo da cilindrico a leggermente clavato, leggermente contorto, di colore biancastro con leggere sfumature brunastre molto pallide.

Carne biancastra, con odore non significativo e sapore leggermente astringente.

Microscopia. Spore subglobose, di $4.0 \times 3.5 \mu\text{m}$ di grandezza; sporata bianca (potrebbe essere confusa con *C. proluxa* per la forma ma che ha spore più grandi).