

SCHEDA N° 0855 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Collybia	SPECIE proluxa	AUTORE (Fr.) Gillet 1876	
DATA DI RACCOLTA 03.08.2025	LUOGO DI RACC. Vodo di Cadore	COMUNE Vodo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 029-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI
☐ TERRENO NUDO
☐ TORBIERA
☐ ARGINE DI FIUME

☐ ORTI E GIARDINI
☐ TERRENO SABBIOSO
☐ TERRENO COLTIVATO A
☐ LUOGO BRUCIATO

☐ MARGINI DI STRADA
☐ ARENILE
☐ BOSCO SUBALPINO
☒ RADO
☐ FITTO

BOSCO DI : Misto di aghifoglia e Faggio

☐ DENTRO AL BOSCO
☒ AI MARGINI DEL BOSCO

☐ SU LEGNO
☐ VIVO
☐ MORTO

DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA
☒ OMBROSA
☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO
☐ MOLTO UMIDO
☒ UMIDO
☐ ASCIUTTO
☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti due esemplari sul bordo di una schiarita.



MICROSCOPIA: Spore brevemente ellittiche, lisce, ialine, 4.8-5.7 x 3.2-4.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G, SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D’ITALIA (1)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI

☐ FRESCHI
☒ SECCHI

 CARPOFORI	 SPORE	 IFE CUTICOLA

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso ad appianato, con largo ambone al centro; cuticola glabra, lardacea, di colore bruno-rossastro scuro; margine inizialmente involuto, sinuoso.

Lamelle da adnate a libere, sinuate, di colore biancastro; presenti numerose lamellule.

Stipite cilindrico, ingrossato alla base, concolore al cappello; presente feltro miceliare biancastro.

Microscopia. Spore brevemente ellittiche, lisce, ialine, di $4.8-(5.15)-5.7 \times 3.2-(3.69)-4.0 \mu$, con Q: $1.31-(1.40)-1.48$.

Note. Si differenzia da *C. butyracea* per le spore brevemente ellissoidali/subglobose.