

SCHEDA N° 0862 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE aurantiobasalis	AUTORE Bidaud	
DATA DI RACCOLTA 04.09.2010	LUOGO DI RACC. Santa Fosca	COMUNE Selva di Cadore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1500 m	I.G.M. 029-III	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso (prevalente) misto a Faggio.		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA


UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE :
MICROSCOPIA: Spore da citriformi a amigdaliformi, verrucose, 7.2-8.2 x 4.3-5.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : CALLEDDA F., CAMPO E. & AL. – GUIDA INTRODUTTIVA AL GENERE CORTINARIUS IN EUROPA

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo appianato-convesso con diametro di c.a. 8 cm, con margine involuto e leggermente ondulato; cuticola asciutta, di colore brunastro, con placche biancastre al centro e residui velari biancastri al bordo; margine sottile, involuto.

Lamelle adnato smarginate, piuttosto spaziate, con filo intero; di colore ocraceo con riflessi lilacini.

Stipite cilindraceo, tozzo, con ampio bulbo marginato alla base; di colore bruno-lilla con fibrille longitudinali più chiare (grigiastre) del velo generale.

Carne chiara, virante al giallo-bruno a partire dal bulbo.

Microscopia. Spore da citriformi a amigdaliformi, verrucose, di circa 7.2-8.2 x 4.3-5.0 μ .