

SCHEDA N° 0854 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE barbarorum	AUTORE Bidaud, Moënné-Loec. & Reum.	
DATA DI RACCOLTA 03.08.2025	LUOGO DI RACC. Cansiglio	COMUNE Cansiglio	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 064-IV	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : Peccio misto a qualche Faggio
☒ RADO
☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti 6-7 semplari in una radura.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, verrucosità marcata e sporgente, 9.7-12.2 x 5.7-7.9 µ.


BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3)

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



CARPOFORI



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da convesso a disteso, con margine involuto; cuticola viscida, giallo-brunastra, con residui di placche velari brunastre; margine debolmente eccedente.

Lamelle smarginate, piuttosto fitte, con riflessi lilacini; filo seghettato.

Stipite cilindrico, bulboso; di colore biancastro, sfumato di azzurro in prossimità delle lamelle.

Carne biancastra, di odore terroso, sapore debole.

Microscopia. Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, papillate, verrucosità marcata e sporgente, 9.7-(10.78)-12.2 x 5.7-(7.12)-7.9 μ , con Q: 1.36-(1.52)-1.69.

Reazioni

Cuticola + KOH $\rightarrow$ brunastra