

SCHEDA N° 0870 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE colymbadinus	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 28.08.2024	LUOGO DI RACC. Padola	COMUNE Padola	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1250 m	I.G.M. 018-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto con prevalenza di conifera		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuto un gruppo di esemplari tra gli aghi.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, apicolate, 8.9-10.2 x 5.4-6.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo di circa 3 cm di diametro nell'esemplare maggiore, emisferico, con largo umbone ottuso e bordo ondulato; superficie liscia, satinata, di colore bruno-rossastro, più scuro al disco, con deboli toni verdastri, sbiadente verso il margine, dove appaiono depositi di peluria (funghi giovani) e, sul bordo, brevi residui velari bianco-giallastri; orlo sottile, regolare.

Lamelle piuttosto spaziate, adnato-smarginate, alternate a lamellule, di colore crema-giallastro, più chiare al margine, con filo debolmente crenulato.

Stipite cilindrico, piuttosto fragile, di colore ocraceo molto pallido, fibrilloso, con regione anulare evidente; base debolmente fittonante, dotata di evidente micelio bianco-giallastro.

Carne brunastra, fragile, con odore e sapore non significativi

Microscopia. Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, apicolate, $8.9\text{--}(9.32)\text{--}10.2 \times 5.4\text{--}(5.90)\text{--}6.3 \mu$, con Q: $1.52\text{--}(1.55)\text{--}1.85$, caratterizzate da piccole placche puntiformi, talora localmente connesse; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici, di circa $24\text{--}35 \times 8\text{--}9 \mu$, con locali placche di colore giallo-verdastro, dotati di giunti a fibbia.