

SCHEDA N° 0849 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE fulvoochrascens var. umbrinus	AUTORE Rob. Henry 1943
DATA DI RACCOLTA 24.08.2025	LUOGO DI RACC. Santa Fosca	COMUNE Selva di Cadore
ALTITUDINE S.L.M. 1500 m	I.G.M. 029-III	RACCOGLITORE Franco Fratta

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Peccio misto a qualche Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA
 ☒ OMBROSA
 ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO
 ☐ MOLTO UMIDO
 ☒ UMIDO
 ☐ ASCIUTTO
 ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :


NOTE : Rinvenuti cinque esemplari parzialmente interrati in una radura.

MICROSCOPIA: Spore amigdaliformi, leggermente verrucose, 11.2-14.0 x 6.7-8.4 µ.

BIBLIOGRAFIA : CETTO B. – I FUNGHI DAL VERO (2) - SATURNIA

DETERMINATORE **Franco Fratta**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

 CARPOFORI	 SPORE	

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo emisferico, di circa 5 cm di diametro; cuticola opaca (fungo secco), biancastra al margine, dove sono presenti residui velari; orlo involuto.

Lamelle adnato-smarginate; di color grigio-violetto.

Stipite subcilindrico, dotato di bulbo napiforme debolmente marginato; di colore bianco ocraceo, appena lilacino nella parte superiore; tracce di velo e cortina biancastri.

Carne biancastra, debolmente virante all'azzurro nella parte centrale del gambo; senza odori o sapori particolari.

Microscopia. Spore amigdaliformi, leggermente verrucose, di 11.2-(12.78)-14.0 x 6.7-(7.22)-8.4 μ , con Q: 1.55-(1.77)-2.0.